

ليسوتو تكافح حادث حريق معزول وسط تحديات استمرار فقدان الغطاء الشجري

ليسوتو تكافح حادث حريق معزول وسط تحديات استمرار فقدان الغطاء الشجري

التقرير

واجهت ليسوتو مؤخرًا حادث حريق معزول في منطقة بوثا-بوئي، وهو تذكير صارخ بالتحديات البيئية التي تواصل البلاد مواجهتها. على مر السنين، شهدت ليسوتو اتجاهًا متقلبًا في فقدان الغطاء الشجري، مع ذروة ملحوظة في عام 2020 عندما تجاوز فقدان 16 هكتارًا. على الرغم من ذلك، شهدت البلاد مكاسب صافية في الغطاء الشجري، مع زيادة تقارب 2758 هكتارًا، مما يشير إلى بعض التعافي والمرونة في نظمها البيئية الغابية.

تكشف البيانات أن أنشطة الغابات قد ساهمت في فقدان الغطاء الشجري، حيث بلغت الانبعاثات من هذا القطاع مستويات مهمة. على سبيل المثال، في عام 2021، كانت الغابات مسؤولة عن أكثر من 3 هكتارات من فقدان الغطاء الشجري وحوالي 1430 ميغا غرام من الانبعاثات الإجمالية لثاني أكسيد الكربون المكافئ. ومع ذلك، فإن غياب البيانات حول العوامل الأخرى المحتملة مثل الزراعة البدائية والحرائق البرية والتحضر في بعض السنوات يشير إلى أن هذه العوامل ربما لم تكن مساهمات كبيرة في التغييرات التي طرأت على الغطاء الشجري.

تمثل مساحة الغطاء الشجري في ليسوتو، التي تقف حاليًا عند قليلاً من 6000 هكتار، جزءًا صغيرًا من إجمالي مساحة الأرض، مما يؤكد على أهمية الحفاظ على هذه المساحات الخضراء. تعتبر جهود البلاد للحد من فقدان الغطاء الشجري وتعزيز إعادة التحريج حاسمة في الحفاظ على توازنها البيئي ومكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ.