

ليسوتو تكافح فقدان الغطاء الشجري وسط حادث حريق حديث في ماسيرو

ليسوتو تكافح فقدان الغطاء الشجري وسط حادث حريق حديث في ماسيرو

التقرير

شهدت ليسوتو اتجاهًا متقلبًا في فقدان الغطاء الشجري خلال العقد الماضي، حيث كان آخر حادث هو تنيبه بحريق في منطقة ماسيرو. على الرغم من أن المساحة الإجمالية للأراضي تزيد عن 3 ملايين هكتار، إلا أن مدى الغطاء الشجري في البلاد يزيد قليلاً عن 6,000 هكتار. تكشف البيانات التاريخية أن فقدان الغطاء الشجري قد شهد زيادة ملحوظة، مع ذروات بارزة في سنوات معينة. على سبيل المثال، سجل عام 2016 أعلى خسارة مسجلة تزيد عن 15 هكتارًا، وهو تباين صارخ مقارنة بالخسارة الطفيفة التي لوحظت في عام 2001.

تم تحديد العوامل الرئيسية لفقدان الغطاء الشجري في ليسوتو على أنها أنشطة الغابات والزراعة المتنقلة، على الرغم من أن مساهمات هذه العوامل تختلف سنويًا. أظهر عام 2021 زيادة كبيرة في فقدان الغطاء الشجري بسبب الغابات، حيث بلغت أكثر من 3 هكتارات. وبشكل عام، يشير التغيير الصافي في الغطاء الشجري إلى زيادة إيجابية تقدر بحوالي 2,758 هكتار عند حساب الخسائر والمكاسب على مر السنين.

تبرز هذه البيانات التحديات البيئية المستمرة التي تواجهها ليسوتو، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إدارة مستدامة لمواردها الغابية. يضيف حادث الحريق الأخير في ماسيرو إلى إلحاح معالجة هذه القضايا البيئية للحفاظ على المشهد الطبيعي للبلاد.