

منطقة ليمبوبو في جنوب إفريقيا تشهد حادث حريق جديد وسط تحديات مستمرة للغطاء الشجري

منطقة ليمبوبو في جنوب إفريقيا تشهد حادث حريق جديد وسط تحديات مستمرة للغطاء الشجري

التقرير

تم الإبلاغ عن حادث حريق جديد في منطقة ليمبوبو بجنوب إفريقيا، مما يسلب الضوء على الصراع المستمر للبلاد مع فقدان الغطاء الشجري. على مدى العقدين الماضيين، شهدت جنوب إفريقيا خسارة صافية في الغطاء الشجري تقدر بحوالي 141,776 هكتار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.86٪ في مدى الغطاء الشجري. يُعزى الجزء الأكبر من هذه الخسارة إلى أنشطة الغابات، التي تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي فقدان الغطاء الشجري والانبعاثات المرتبطة بثاني أكسيد الكربون.

كما يلعب التحول الزراعي دوراً كبيراً في استنزاف الغطاء الشجري، يليه التحضر، الذي يساهم بدرجة أقل ولكنه لا يزال يشكل تأثيراً كبيراً. تظل الحرائق البرية، على الرغم من مسؤوليتها عن جزء أصغر من فقدان الغطاء الشجري، تهديداً دائماً، كما يتضح من أحدث تنبيه بوجود حريق.

تكشف البيانات عن اتجاه متقلب ولكنه مثير للقلق لفقدان الغطاء الشجري على مر السنين، حيث شهدت بعض السنوات معدلات أعلى من غيرها. التأثير التراكمي لهذه الخسائر هو شهادة على التحديات البيئية التي تواجهها الأمة. يعتبر الحادث في ليمبوبو تذكيراً بالضغط البيئية المستمرة والحاجة إلى اليقظة المستمرة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.



