

انخفاض مستمر في غطاء الأشجار في جنوب إفريقيا وسط حادث حريق ليمبوبو الأخير

انخفاض مستمر في غطاء الأشجار في جنوب إفريقيا وسط حادث حريق ليمبوبو الأخير

التقرير

في تطور حديث، أبلغت جنوب إفريقيا عن حادث حريق في منطقة ليمبوبو، مما يسלט الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه البلاد في الحفاظ على غطاء الأشجار. على مدى العقدين الماضيين، شهدت جنوب إفريقيا خسارة صافية في غطاء الأشجار، مع انخفاض بنسبة 1.86٪ من مداها الأصلي. يبلغ مدى غطاء الأشجار في البلاد حوالي 5.98 مليون هكتار، وقد تعرض لضغوط مختلفة، مما أدى إلى خسارة إجمالية تزيد عن 530,000 هكتار.

تم تحديد الأنشطة الزراعية والحرجية كمحركات رئيسية لفقدان غطاء الأشجار، وهي تساهم بشكل كبير في الانخفاض العام. وبشكل خاص، كانت الأنشطة الحرجية هي الأكثر إسهامًا، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من فقدان غطاء الأشجار كل عام. لعبت التحضر والحرائق أيضًا دورًا، على الرغم من أنها كانت أقل تأثيرًا.

تشير البيانات إلى تفاعل معقد للعوامل التي تؤدي إلى انخفاض غطاء الأشجار في جنوب إفريقيا. بينما كان هناك بعض الزيادة، مع أكثر من 388,000 هكتار من غطاء الأشجار المضاف، يؤكد الخسارة الصافية على الحاجة إلى استمرار الاهتمام بجهود الحفظ. يعتبر حادث الحريق الأخير في ليمبوبو تذكيرًا بالتهديد المستمر للحرائق للموارد الطبيعية للبلاد.