

# نيجيريا تواجه فقدان الغطاء الشجري وسط حادث حريق حديث في زمفارة

# نيجيريا تواجه فقدان الغطاء الشجري وسط حادث حريق حديث في زمفارة

## التقرير

في تطور حديث، أبلغت نيجيريا عن حادث حريق في منطقة زمفارة، مضافة إلى تحديات البيئة في البلاد. على مدى العقدين الماضيين، شهدت نيجيريا تغيرات كبيرة في غطائها الشجري. أظهر تحليل البيانات التاريخية خسارة صافية تبلغ 1,468,749 هكتار في الغطاء الشجري، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.07% من الغطاء الشجري الثابت الذي يبلغ 20,636,992 هكتار.

تم تحديد الزراعة البدائية كالسائق الرئيسي لفقدان الغطاء الشجري، وهي مسؤولة عن جزء كبير من إزالة الغابات. كما يساهم التحضر بشكل ملحوظ في الخسارة، مما يعكس تأثير توسع المدن النيجيرية على المواطن الطبيعية. غياب بيانات الحرائق البرية في العوامل التاريخية يشير إلى أن حادث الحريق الأخير في زمفارة هو شذوذ وليس سببًا شائعًا لفقدان الغطاء الشجري.

تتصاعد اتجاهات فقدان الغطاء الشجري، حيث سُجّلت أعلى خسارة في عام 2017، بمقدار 171,045 هكتار. تحمل هذه الخسارة تداعيات كبيرة على التنوع البيولوجي في البلاد، ودورات المياه، والمناخات المحلية. يعتبر الحادث الأخير في زمفارة تذكيرًا بالتحديات البيئية المستمرة التي تواجه نيجيريا.



